

Regulace použití rašelino-sapropelového hnojiva "PRECOGROW"

Pěstované plodiny	Osivo, sadbový materiál, l/tunu		Rostliny během vegetace, l/ha			Půda, l/ha		Rostlinné zbytky, l/ha	
	dávka hnojiva	spotřeba na pracovní řešení	fáze rozvoje rostlin	dávka hnojiva	spotřeba na pracovní řešení	dávka hnojiva	spotřeba na pracovní řešení	dávka hnojiva	spotřeba na pracovní řešení
Obiloviny (zimní, jarní sklizně)	0,5	10,0	1) Odnožování 2) Vyrázení stonku 3) Kvetení	1,5	100-300	Ošetřování před setbou (kultivace před setbou)		Po sklizni (před vláčením, orbou) + dusíkové hnojivo 15-20 kg/ha	
						2,0-3,0	300	5,0-7,0	300
Luštěniny (sojové boby, hrách, cizrna, čočka)	0,7	12,0	1) Fáze 3-5 listů; 2) Začátek rašení	1,5	100-300	1,5-2,0	300	2,0-3,0	300
Bavlník	1,0	10,0	1) Klíčení a vzejití 2) Začátek rašení 3) Začátek kvetení	2,0	100-200	2,0-3,0	300	5,0-7,0	300
Trvalé zrniny, luštěniny	0,5	12,0	1) Větvení, 1 roční použití; 2) Růstová fáze, 2 roční použití - (lusky) 3) Po žatvě, 2 roky použití; 4) Fáze rašení (lusky)	2,0	200-300	1,5-2,0	300	Kultivace po žatvě	
								3,0-5,0	300
Kukuřice, Čirok, Súdánská tráva	1,0	12,0	1) Fáze 2-3 listů; 2) Fáze 6-7 listů	2,5	200-300	2,0-3,0	300	Hnojivo naředte 2 hodiny před aplikací malým množstvím vody, pak jej smíchejte s pracovním roztokem. Přidejte	

								do pracovního roztoku 15-20 kg dusíkatého hnojiva	
								10,0	300
Slunečnice	1,0	12,0	1) Fáze 2-4 listů; 2) Fáze 6-8 listů	2,5	200-300	2,0-3,0	300	10,0	300
Brambory	2,0	10,0	1) Klíčení a vzejití; 2) Fáze rašení - počátek kvetení	2,5	100-300	ošetření před hloubením řádků		-	-
						5,0-7,0	300		
Rajčata	Máčení semen po dobu 1-2 hodiny s následným sušením		1) Fáze 2-3 listů; 2) 1,5-2 týdny po setbě; 3) Fáze rašení - počátek kvetení; 4) Iniciační fáze nasazení plodů	2,0	100-300	zalití půdy před vysazením sadby, je možné požití s dalšími minerálními složkami		-	-
	100 ml na 1 l vody	1 l na 1 kg				2 l hnojiva na 998 l vody			
Okurky	100 ml na 1 l vody	1 l na 1 kg	1) Fáze 2-3 listů; 2) Fáze rašení - počátek kvetení; 3) Iniciační fáze nasazení plodů	2,0	100-300	2 l hnojiva na 998 l vody		-	-
Mrkev, zelí, salát	100 ml na 1 l vody	1 l na 1 kg	1) Fáze 2 listů; 2) Fáze 4-6 listů; 3) Začátek utváření kořenů nebo hlávky	2,0	100-300	3,0-5,0	300	-	-
Semeno řepky, řepková setba (zimní, jarní sklizně)	0,5	10	1) Vzejití 1. páru listů; 2) Zahájení utváření listové rozety; 3) Začátek rašení	2,5	200-300	Ošetřování před setbou (kultivace před setbou)		Kultivace po žatvě	
						2,0-3,0	300	3,0-5,0	
Len	0,7	12	1) Vzejití; 2) Zahájení utváření listové spirály; 3) Začátek rašení	2,0	100-200	2,0-3,0	300	Hnojivo naředte 2 hodiny před aplikací malým množstvím vody, pak jej smíchejte s pracovním roztokem. Přidejte do pracovního roztoku 15-20 kg dusíkatého hnojiva	

								10,0	300
Pohanka	0,7	10	1) Vzejití; 2) Začátek rašení	2,0	100-200	2,0-3,0	300	3,0-5,0	300
Rýže	0,7	10	1) Odnožování 2) Vyrázení stonku 3) Kvetení	3,0	200-300	-	-	10,0	300
Zahradní jahody, jahodník	namočte setbu 2-3 hodiny před vysazení nebo zalijte při sázení		1) když listy na jaře znovu vyrůstají; 2) Fáze 2-3 listů; 3) Fáze rašení - počátek kvetení; 4) Rozvoj semeníku; 5) Před zráním plodů; 6) Po období plodů	3,0	150-200	Orba na podzim nebo na jaře před setbou semen		-	-
	1 l na 99 l vody	1,5-2,0 litry na 1 m ² oseté plochy				3,0-5,0	300-500		
Česnek, cibule	stroužky po roztřídění před vysazením máčejte po 1-2 hodiny		1) Na jaře, když se objeví výhonky (doporučuje se v kombinaci s dusíkatými doplňky); 2) Počínání cibulí; 3) Zvětšování cibulí;	2,5	150-200	Obdělání zbytků strniště po sklizni předplodin, před odplevelením nebo podmítáním nebo před kultivací setbou		-	-
	200 ml na 800 ml vody	1,5-2,05 l na 1 kg				10,0	150-200		
Červená řepa	0,5	10	1) Fáze 2-3 listů; 2) Před rozložením listů	3,0	200-300	Obdělání zbytků strniště po sklizni předplodin, před odplevelením nebo podmítáním nebo před kultivací setbou. Hnojivo naředte 2 hodiny před aplikací malým množstvím vody, pak jej smíchejte s pracovním roztokem. Doporučuje se přidat do pracovního roztoku 15-20 kg dusíkatého hnojiva			
						10,0	300		
Meloun	máčení semen po dobu 1-2 hodiny s následným sušením		1) Fáze 3-4 listů; 2) Než se rozvinou třmínky; 3) Kvetení;	2,5	200-300	Obdělání zbytků strniště po sklizni předplodin, před odplevelením nebo podmítáním nebo před kultivací setbou		-	-

	100 ml na 900 ml vody	1,0-1,5 na 1 kg	4) Růst a zrání plodu			5,0	300		
Ovocné stromy a keře	1,0	50	1) Fáze dormance; 2) Počínání oddělování poupat; 3) Fáze růžových poupat; 4) Zahájení utváření listové rozety; 5) První fáze kvetení; 6) Zrání plodů	10,0	800-1000	Hnojivá závlaha (fertigace), spotřeba hnojiva 6 l/ha.			
Vinná réva	1,0	50	1) Před kvetením; 2) Růst hroznů; 3) Počátek hromadění cukru	4,0	200-300	Hnojivá závlaha (fertigace), spotřeba hnojiva 10 l/ha.			